

サニー バイタル[®]


成り疲れ予防・軽減・回復

麦芽発酵物+メチオニンが効果を発揮

- 根圏を充実させ、養分の吸収力が向上
- 成り疲れの予防・軽減・回復による、安定多収
- 麦芽発酵物などの各種有機物により果実品質が向上

*イメージ図

サニーバイタル



安定多収
品質向上

発根・養分吸収UP




製品写真は旧社名品です。製品のパッケージ、デザインなどの仕様は予告なく変更する場合があります。

| | |
|-----------|---|
| 肥料登録品 | 内容量……………6Kg/本(約5L) 肥料登録番号…生第107216号 |
| 保証成分量 (%) | 窒素全量……………6.0 水溶性りん酸…3.0 水溶性加里………1.0 |

イチゴの試験例

葉全体が立ち上がり、草勢や花付きが良好

厳冬期の収量安定、成り疲れの予防・軽減・回復



試験地：熊本県
試験期間：2021年9月～2022年5月
栽培方法：高設栽培
10/15以降、サニーバイタルまたは他社液肥を500倍希釈し、各株元に330mL(原液0.66mL)を隔週で灌注処理。他社液肥は窒素成分10%

ピーマンの試験例


根のボリュームが増加



栽培終了後の地下部(2021/12/3撮影)

試験地：熊本県
 試験期間：2021年6月～2021年11月
 栽培方法：30cmポットでの栽培(夏秋作型)
 サニーバイタルまたは他社液肥を500倍希釈し、6月下旬以降、
 0.7L(原液1.4mL)/ポットを隔週で灌注処理。他社液肥は窒素成分10%

成り疲れが軽減され、栽培終盤までしっかり収穫



| | 総収量 (kg / 株) |
|----------|--------------|
| 他社液肥区 | 12.3 |
| サニーバイタル区 | 13.4 |

使用例

| 葉面散布 | 希釈倍率 | 500～1000倍 |
|------|-----------------------|------------------------|
| | 使用量 | 200～300L/10a |
| 土壌灌注 | 原液換算で10～20kg/10aを適宜希釈 | |
| 作物 | 使用時期 | 改善項目 |
| 果菜類 | 定植時 | 発根、活着 |
| | 定植以降、特に生育中後期 | 養分吸収 秀品率、収量 成り疲れ |

- 本品を利用する場合、肥料は従来と同じ量を施肥することをおすすめします。
- 使用量は作物の種類や大きさ、使用する環境や場面、方法などで適宜調整してください。

【使用上の注意】

- ・石灰硫黄合剤と混合すると有毒ガスが発生する恐れがありますので、混用しないでください。
- ・金属容器は本液で徐々に腐蝕される危険性がありますので、ご注意ください。
- ・原液あるいは濃度の高い液肥が直接葉や新芽にかかると、肥料焼けの危険がありますので、注意してください。
- ・強いアンモニア資材とは混用しないでください。アンモニアが発生し植害を起こすことがあります。

<応急措置>

- ・飲み込んだ場合：直ちに医療措置を受ける手配をし、医師の診断を受けてください。
- ・眼に入った場合：直ちに十分な水で洗い、至急医師の診断を受けてください。

<保管方法>

- ・直射日光や雨露を避け、冷暗所で幼児の手の届かない所に食品と区別して保管してください。
- ・冬期間は凍結しないように屋内等で保管してください。

当社取扱い
 製品情報



販売店

販売元  住化アグリテック株式会社
 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目6番17号

2026年4月1日：社名変更(旧社名：住化農業資材株式会社)

F014C26-2026.03.0(沢)